

FOLFIRI+RAM療法(大腸癌)

	1 休薬期間	
	基準日	13日後
点滴・注射	<p>■---【注射】 生食注シリジ「オーツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 ×1回 医師の指示通り 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ポートトラブル確認用 フィルター付の点滴セットを使用すること ×1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フゾー」100mL … 1瓶 アロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ボラタミン注 5mg (1mL) … 1管 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)サイラムザ点滴静注液 … 8mg/kg ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フゾー」100mL … 1瓶 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m² ? 時間かけて … 2 イリノテカンの側管より 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)イリノカント点滴静注液100mg … 150mg/m² ? 時間かけて … 2 レボホリナートと同時に 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 400mg/m² レボホリナート、イリノテカン終了後全閉で投与 ×1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フゾー」100mL … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m² ? 時間かけて … 46 液量が100mLになるように生食の量を調整して充填する 点滴注射 … 1 1回 ヘパリンNaロック用100単位/mL【10mL】 … 1筒 CVポートに静注 ×1回 医師の指示通り 1回 </p>	<p>■---【コメント】 休薬期間</p>