FOLFIRI+Pmab療法（大腸癌）

	1	休薬期間
	基準日	13日後
点滴・注射	■---【注射】 生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」10mL … 1筒 CVポートに静注 ×１回　医師の指示通り 1回 大塚生食注（50mL）… 1瓶 ポートトラブル確認用 フィルター付の点滴セットを使用すること ×１回　医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100mL … 1袋 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液 6.6mg/2mL（旧8mg）… 1瓶 ？ 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗）ベクティビックス点滴静注 … 6mg/kg ？ 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（50mL）… 1瓶 ？ 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL）… 1袋 抗）レボホリナート点滴静注用 … 200mg/㎡ ？ 時間かけて … 2 イリノテカンの側管より 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL）… 1袋 抗）ｲﾘﾉﾃｶﾝ点滴静注液100mg … 150mg/㎡ ？ 時間かけて … 2 レボホリナートと同時に 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（50mL）… 1瓶 抗）フルオロウラシル注 … 400mg/㎡ レボホリナート、イリノテカン終了後全開で投与 ×１回　医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗）フルオロウラシル注 … 2400mg/㎡ ？ 時間かけて … 46 液量が１００mLになるように生食の量を調整して充填する 点滴注射 … 1 1回 ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位/mL【10mL】… 1筒 CVポートに静注 ×１回　医師の指示通り 1回	■---【コメント】 休薬期間