

# SOX+BEV療法(大腸癌)

		1 休薬期間												
基準日		20日後												
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶                      アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶                      テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶                      ? 分間かけて … 15                      TS-1併用: 1日80mg/m<sup>2</sup> 分2 day1~14服薬                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶                      抗)アバステン … 7.5mg/kg                      投与時間: 初回90分→2回目60分→3回目以降30分                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋                      抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 130mg/m<sup>2</sup>                      ? 時間かけて … 2                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 0.5管                      オキサリプラチンへ混入する                      × 1回 医師の指示通り                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶                      全開で                      × 1回 医師の指示通り                      点滴注射 … 1                      1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>												
	薬物投与	<p>エスワン配合OD錠 1日2回 2週投与、1週休薬</p> <table border="1"> <tr> <td>体表面積</td> <td>/</td> <td>初回基準量(テガフル相当)</td> </tr> <tr> <td>1. 25m<sup>2</sup>未満</td> <td>/</td> <td>40mg/回</td> </tr> <tr> <td>1. 25m<sup>2</sup>以上~1. 5m<sup>2</sup>未満</td> <td>/</td> <td>50mg/回</td> </tr> <tr> <td>1. 5m<sup>2</sup>以上</td> <td>/</td> <td>60mg/回</td> </tr> </table>	体表面積	/	初回基準量(テガフル相当)	1. 25m <sup>2</sup> 未満	/	40mg/回	1. 25m <sup>2</sup> 以上~1. 5m <sup>2</sup> 未満	/	50mg/回	1. 5m <sup>2</sup> 以上	/	60mg/回
体表面積	/	初回基準量(テガフル相当)												
1. 25m <sup>2</sup> 未満	/	40mg/回												
1. 25m <sup>2</sup> 以上~1. 5m <sup>2</sup> 未満	/	50mg/回												
1. 5m <sup>2</sup> 以上	/	60mg/回												