

# SOX療法(大腸癌)

		1 休薬期間
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶            アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶            ? 分間かけて … 15            TS-1併用: 1日80mg/m<sup>2</sup> 分2 day1~14服薬            点滴注射 … 1            1回            大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋            抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 130mg/m<sup>2</sup>            ? 時間かけて … 2            点滴注射 … 1            1回            テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 0.5管            オキサリプラチンへ混入する            × 1回 医師の指示通り            点滴注射 … 1            1回            大塚生食注 (50mL) … 1瓶            全開で            × 1回 医師の指示通り            点滴注射 … 1            1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>エスワン配合OD錠 1日2回 2週投与、1週休薬</p> <p>体表面積 / 初回基準量(テカフル相当)</p> <p>1. 25m<sup>2</sup>未満 / 40mg/回</p> <p>1. 25m<sup>2</sup>以上~1. 5m<sup>2</sup>未満 / 50mg/回</p> <p>1. 5m<sup>2</sup>以上 / 60mg/回</p>	