

mFOLFOX6+BEV療法(大腸癌)

	1 休薬期間	
	基準日	13日後
<p>点滴・注射</p>	<p>■---【注射】 生食注シリンジ「オーツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ポートトラブル確認用 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)アバスタチン … 5mg/kg 投与速度: 初回90分→2回目60分→3回目以降30分 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回 グラニセロン点滴静注パツク 3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回 ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m² ? 時間かけて … 2 オキサリプラチン注の側管より 点滴注射 … 1 1回 ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 85mg/m² ? 時間かけて … 2 レボホリナートと同時に 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 400mg/m² レボホリナート、オキサリプラチン終了後全開で投与 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m² ? 時間かけて … 46 液量が100mLになるように生食の量を調整して充填する 点滴注射 … 1 1回 ヘパリンNaパツク用100単位/mL【10mL】 … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回</p>	<p>■---【コメント】 休薬期間</p>