

# mFOLFOX6+Pmab療法(大腸癌)

	1 休薬期間	
	基準日	13日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生食注シリンジ「オーツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ポートトラブル確認用 フィルター付の点滴セットを使用すること × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ゲラニセロン点滴静注パック3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)ペクティビックス点滴静注 … 6mg/kg ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 2 オキサリプラチン注の側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 85mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 2 レボホリナートと同時に 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 400mg/m<sup>2</sup> レボホリナート、オキサリプラチン終了後全開で投与 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 46 液量が100mLになるように生食の量を調整して充填する 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ヘパリンNaロック用100単位/mL【10mL】 … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>