

mFOLFOXIRI＋ベバシズマブ療法（切除不能）

	Day1
	■---【注射】 生食注シリンジ「オーツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ）… 1袋 ポートトラブル確認用 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗）ベバシズマブBS点滴静注 … 5mg/kg 90 分間かけて 初回投与時は90分かけて点滴静注する。忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分、それ以降の投与は30分間投与とする。 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ）… 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 パロ/セロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」… 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL（旧8mg）… 1瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg）… 1管 30 分間かけて 投与速度は通常の2倍速度に設定すること（界面活性剤を含有しているため通常の投与速度では予定時刻に投与が終了しません） 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ）… 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回 ブドウ糖注射液〈5%〉250mL「テルモ」… 1袋 抗）イリリテカン点滴静注液100mg … 150mg/m² 1 時間かけて 点滴注射 … 1
点滴・注射	

点滴時間 1 時間

1 回

ブドウ糖注射液〈5%〉250mL「テルモ」… 1 袋

抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m²

2 時間かけて

側管より

オキサリプラチンと同時に投与

点滴注射 … 1

1 回

ブドウ糖注射液〈5%〉250mL「テルモ」… 1 袋

抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 85mg/m²

2 時間かけて

レボホリナートと同時に投与

点滴注射 … 1

1 回

生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1 瓶

抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m²

46 時間かけて

流量換算表を参照し、適当量の生食を充填する

点滴注射 … 1

1 回

ヘパリンNaロック用100単位/mL【10mL】… 1 筒

CVポートに静注

× 1 回 医師の指示通り

抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1

1 回

大腸がん)

Day14
■---【コメント】 休薬期間

