

# AP療法(子宮体癌)

	1 休薬期間	
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液バッグ「フソー」1L … 1袋            ? 時間かけて … 4</p> <p>主管①            点滴注射 … 1            1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶            アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶            テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶            テキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管            ? 分間かけて … 30</p> <p>①の側管より            点滴注射 … 1            1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶            抗)ドキシソルピシン注射 … 60mg/m<sup>2</sup>            × 1回 医師の指示通り</p> <p>①の側管より全開で            点滴注射 … 1            1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶            全開で            ①の側管より            点滴注射 … 1            1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋            抗)シスプラチン注 … 50mg/m<sup>2</sup>            ? 時間かけて … 2</p> <p>主管②            点滴注射 … 1            1回</p> <p>リセートD輸液 500mL … 1袋            ? 時間かけて … 2</p> <p>主管③            点滴注射 … 1            1回</p> <p>リセートD輸液 500mL … 1袋            ? 時間かけて … 2</p> <p>主管④            点滴注射 … 1            1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>アプレビタントCap (125) … 1Cap 1 × / 1日            抗悪性腫瘍剤投与1時間～1時間30分前に投与            アプレビタントCap (80) … 1Cap 1 × 朝食後 / 2日 (翌日から開始)</p>	