

ビダーザ単独療法(骨髄異形成症候群)

	1	2	3	4
	基準日	1日後	2日後	3日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>
薬物投与	グラニセトロン内服ゼリー2mg … 1包 1×/7日			

5	6	7	休業期間
4日後	5日後	6日後	27日後
<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>抗)ビダーザ注100mg … 75mg/m² 注射用水【20mL】… 1管 1Vを4mLで溶解する(25mg/mL) 投与直前に均一に懸濁し投与する。 投与量が6mLを越える場合は2等分し、2箇所へ注射する。 ★調製後1時間以内に使い切ること 皮下注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>