

XELOX+Tmab療法(胃癌)

		1 休薬期間										
基準日		20日後										
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50mL) … 1瓶 ルート確保用 カペシタビン併用:1日2000mg/m² 分2 14日間服薬 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(250mL) … 1袋 抗)トラスツズマブ点滴静注 … 8mg/kg(初回)、6mg/kg(2回目以降) 投与速度:初回90分→2回目以降30分 点滴注射 … 1 1回</p> <p>グラニセロン点滴静注パック3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL(旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚糖液5% 500mL(ブドウ糖注)… 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 130mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL(旧4mg) … 0.5管 オキサリプラチンへ混入する ×1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注(50mL) … 1瓶 全開で ×1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>										
	薬物投与	<p>カペシタビン錠(300) 1日2回 2週投与、1週休薬</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>体表面積</th> <th>初回基準1回量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.36m²未満</td> <td>1200mg(4錠)</td> </tr> <tr> <td>1.36m²以上~1.66m²未満</td> <td>1500mg(5錠)</td> </tr> <tr> <td>1.66m²以上~1.96m²未満</td> <td>1800mg(6錠)</td> </tr> <tr> <td>1.96m²以上</td> <td>2100mg(7錠)</td> </tr> </tbody> </table>	体表面積	初回基準1回量	1.36m ² 未満	1200mg(4錠)	1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1500mg(5錠)	1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1800mg(6錠)	1.96m ² 以上	2100mg(7錠)
体表面積	初回基準1回量											
1.36m ² 未満	1200mg(4錠)											
1.36m ² 以上~1.66m ² 未満	1500mg(5錠)											
1.66m ² 以上~1.96m ² 未満	1800mg(6錠)											
1.96m ² 以上	2100mg(7錠)											