

CHOP療法(悪性リンパ腫)

		休薬期間
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>グラセトン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 ★閉鎖式輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 50mL 抗)オンコビン注射用 … 1.4mg/m² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 100mL 抗)ドキシルピシン注射 … 50mg/m² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL … 500mL 抗)エンドキサン … 750mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 50mL × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>プレドニゾロン錠 … 5日間内服 アブレピタントCap (125) … 1Cap 1× / 1日 アブレピタントCap (80) … 1Cap 1× 朝食後 / 2日 (翌日から)</p>	