

# GB療法(悪性リンパ腫)

	1	2	3
	基準日	1日後	2日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50mL)…1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(溶解液付)…2瓶 ★フィルター付き点滴セットを使用すること ? 分間かけて…30 点滴注射…1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL…1瓶 点滴開始時にアセトアミノフェン錠及びボラミン錠を内服 ? 時間かけて…1 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…210mL 抗)ガザイバ点滴静注…1000mg/body 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射…1 1回 大塚生食注(50mL)…1瓶 ? 分間かけて…30 点滴注射…1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL…1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL(旧4mg)…1管 ? 分間かけて…30 ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレピタントを点滴30分前に服薬 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…1袋 抗)トリアキシン点滴静注…90mg/m<sup>2</sup> 大塚蒸留水(500mLゴム栓)…80mL ? 時間かけて…1 1Vあたり蒸留水40mLで溶解する。 ★調製後3時間以内に使い切ること 点滴注射…1 1回 大塚生食注(50mL)…1瓶 全開で 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…1袋 トリアキシン点滴時に同時投与 (血管炎、静脈炎予防) 側管より 点滴注射…1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL…1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL(旧4mg)…1管 ? 分間かけて…30 ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレピタントを朝食後に服薬 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…1袋 抗)トリアキシン点滴静注…90mg/m<sup>2</sup> 大塚蒸留水(500mLゴム栓)…80mL ? 時間かけて…1 1Vあたり蒸留水40mLで溶解する。 ★調製後3時間以内に使い切ること 点滴注射…1 1回 大塚生食注(50mL)…1瓶 全開で 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…1袋 トリアキシン点滴時に同時投与 (血管炎、静脈炎予防) 側管より 点滴注射…1 1回</p>
薬物投与	アセトアミノフェン錠…1×/1日 ボラミン錠…1×/1日	アプレピタントCap(125)…1Cap 1×/1日	アプレピタントCap(80)…1Cap 1×朝食後/2日

	4	5 休業期間	
	7日後	14日後	27日後
	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(50mL)…1瓶 ソル・マトロール静注用40mg(溶解液付)…2瓶 ★フィルター付き点滴セットを使用すること ? 分間かけて…30 点滴注射…1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL…1瓶 点滴開始時にアセトアミノフェン錠及びボラミン錠を内服 ? 時間かけて…1 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…210mL 抗)ガザイバ点滴静注…1000mg/body 全量250mLとなるよう調製する。 25mL/時から投与を開始し、30分毎に25mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射…1 1回 大塚生食注(50mL)…1瓶 ? 分間かけて…30 点滴注射…1 1回</p> <p>アセトアミノフェン錠…1×/1日 ボラミン錠…1×/1日</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL…1瓶 ★フィルター付き点滴セットを使用すること ルート確保用 点滴注射…1 1回 大塚生食注(250mL)…210mL 抗)ガザイバ点滴静注…1000mg/body 全量250mLとなるよう調製する。 25mL/時から投与を開始し、30分毎に25mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 投与開始30分前までにアセトアミノフェン錠(カロナール)及びボラミン錠を服用 点滴注射…1 1回 大塚生食注(50mL)…1瓶 全開で 点滴注射…1 1回</p> <p>アセトアミノフェン錠…1×/1日 ボラミン錠…1×/1日</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>