

PEM+CBDCA療法(非小細胞肺癌)

	1) 休薬期間	
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アリムタ注射用 … 500mg/m² ? 分間かけて … 10 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:5 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	パンピタン末 1g 1× … 初回1週間前から連日投与 メコパラミン注 1mg 1× 筋注/9週毎	