

PEM+CDDP+BEV療法(非小細胞肺癌)

	1	2		3 休業期間
	基準日	1日後	2日後	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキソ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アリムタ注射用 … 500mg/㎡ ? 分間かけて … 10 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)シスプラチン注 … 75mg/㎡ ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アバステン … 15mg/kg 投与速度: 初回90分→2回目60分→3回目以降30分 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDソリター-T3号輸液【500mL】[ヒシナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>
薬物投与	<p>アプレピタントCap (125) … 1cap 1×/1日 抗悪性腫瘍剤投与1時間~1時間30分前に投与 バンピタン末…1g 1×/初回1週間前から連日投与 メコバラミン注…1mg 1×/9週毎 筋注</p>	<p>アプレピタントCap (80mg) … 1cap 1×朝食後/2日</p>		