

放射線併用CP療法(非小細胞肺癌)

	基準日	7日後	14日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>
薬物投与	レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日	レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日	レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日

21日後	28日後	35日後	休業期間 41日後
<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管 ? 分間かけて … 15 点滴前にレスタミン錠内服 フィルター付きの点滴セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)パクリタキセル注 … 40mg/m² ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:2 ? 時間かけて … 1 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p>	休業期間
レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日	レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日	レスタミン錠10mg … 5錠 1×/1日	休業期間