

nab-PTX+CBDCA療法(非小細胞肺癌)

	1	2	3	
	基準日	7日後	14日後	
			休薬期間 20日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アブラキサン点滴静注用100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 30 投与液量は5mg/mLの濃度で調製する 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:5 ? 分間かけて … 60 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アブラキサン点滴静注用100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 30 投与液量は5mg/mLの濃度で調製 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アブラキサン点滴静注用100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 30 投与液量は5mg/mLの濃度で調製 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>