

CPT-11単独療法(卵巣癌)

	1	2	3	
	基準日	7日後	14日後	
			休業期間 27日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)イリテカン点滴静注液100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)イリテカン点滴静注液100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)イリテカン点滴静注液100mg … 100mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>