

GEM+CBDCA療法(卵巣癌)

	1	2	
	基準日	休薬期間	
	7日後	20日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶</p> <p>アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶</p> <p>デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶</p> <p>デキサト注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管</p> <p>? 分間かけて … 15</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚糖液 5%《100mL》(ブドウ糖注) … 1瓶</p> <p>抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 30</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋</p> <p>抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC:4</p> <p>? 時間かけて … 1</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶</p> <p>ルートフラッシュ用</p> <p>全開で</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラネセロン点滴静注パック3mg/100mL … 1袋</p> <p>デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶</p> <p>? 分間かけて … 15</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚糖液 5%《100mL》(ブドウ糖注) … 1瓶</p> <p>抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 30</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶</p> <p>ルートフラッシュ用</p> <p>全開で</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>アプレピタントCap(125) … 1Cap 1×/1日</p> <p>アプレピタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日 (翌日から)</p>		