

DTX単独療法(前立腺癌)

	1	休薬期間
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注(250mL) … 1袋</p> <p>①: 側管投与開始後クランプし、抗がん剤投与終了後5分間フラッシュした後抜去可。</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶</p> <p>ポラミン注 5mg (1mL) … 1管</p> <p>点滴開始時にルート</p> <p>①-a</p> <p>管注 … 1</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液【20mL】 … 1管</p> <p>ファモチジン注射用 20mg [カスター] … 1管</p> <p>点滴開始時にルート</p> <p>①-b</p> <p>管注 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注(250mL) … 1袋</p> <p>抗)ドセタキセル点滴静注 … 75mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 90</p> <p>点滴①開始30分後より開始</p> <p>側管より</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	プレドニゾロン錠(5) … 連日投与	