

FOLFIRINOX療法(膵癌)

	1	休薬期間
	基準日	13日後
	<p>■---【注射】</p> <p>生食注シリンジ「オツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ポートトラブル確認用 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 アロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサト注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 アフレビタントを併用すること ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 85mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ブドウ糖注射液 5%【250mL】 … 1袋 抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m² ? 時間かけて … 2 オキサリプラチン終了後に投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管から投与(イリノテカン投与前) × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)イリノテカン点滴静注液100mg … 180mg/m² ? 分間かけて … 90 レボホリナート投与開始30分後から側管よりレボホリナートと同時に投与する 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 400mg/m² レボホリナート、イリノテカン終了後全開で投与 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m² ? 時間かけて … 46 液量が100mLになるように生食量を調整して充填する 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ヘパリンNaロック用100単位/mL【10mL】 … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
点滴・注射		
薬物投与	<p>アフレビタントCap (125) … 1Cap 1 × / 1日 アフレビタントCap (80) … 1Cap 1 × 朝食後 / 2日 (翌日から) デカドロン錠(0.5) … 16錠 2 × / 3日 (翌日から)</p>	