

# オブジーボ＋ヤーボイ療法(腎細胞癌)

	1 休薬期間	
	基準日	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶                      ルート確保用。側管開始後クランプ                      メインルート                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚生食注(50mL) … 1瓶                      ★フィルター付の点滴セットを使用すること                      側管より投与①                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶                      抗)オブジーボ点滴静注 … 240mg/body                      ? 分間かけて … 30                      側管より投与②                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚生食注(50mL) … 1瓶                      ? 分間かけて … 30                      側管より投与③                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚生食注(50mL) … 20mL                      抗)ヤーボイ点滴静注 … 1mg/kg                      生食20mLにヤーボイ0.2mL/kg混注                      ? 分間かけて … 30                      側管より投与④                      点滴注射 … 1                      1回</p> <p>大塚生食注(50mL) … 1瓶                      全開で                      側管より投与⑤                      点滴注射 … 1                      1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>