

AMR単独療法(小細胞肺癌)

	1	2	3	
	基準日	1日後	2日後	
			休薬期間 20日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)カルセド注射用 … 40mg/m² ? 分間かけて … 5 ★調製後3時間以内に使い切ること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)カルセド注射用 … 40mg/m² ? 分間かけて … 5 ★調製後3時間以内に使い切ること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗)カルセド注射用 … 40mg/m² ? 分間かけて … 5 ★調製後3時間以内に使い切ること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>