

# BEP療法(精巣腫瘍)

	1	2	3	4	
	基準日	1日後	2日後	3日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>リサードD輸液 500mL(ヴィーンD) … 1袋 ? mL/h … 167 主管① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 2袋 生理食塩液バッグ 500mL … 2袋 マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? mL/h … 167 主管② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 主管①投与終了後、側管より投与 ? 分間かけて … 15 管注 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 90 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 20mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 5 【全量250mLに調製】 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 主管③ 翌日点滴開始まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リサードD輸液 500mL(ヴィーンD) … 1袋 ? mL/h … 167 主管① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 2袋 生理食塩液バッグ 500mL … 2袋 マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? mL/h … 167 主管② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 主管①投与終了後、側管より投与 ? 分間かけて … 15 管注 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 90 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 20mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 5 【全量250mLに調製】 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)プレオ注射用 … 30mg/body ? 分間かけて … 30 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 主管③ 翌日点滴開始まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リサードD輸液 500mL(ヴィーンD) … 1袋 ? mL/h … 167 主管① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 2袋 生理食塩液バッグ 500mL … 2袋 マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? mL/h … 167 主管② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 主管①投与終了後、側管より投与 ? 分間かけて … 15 管注 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 90 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 20mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 5 【全量250mLに調製】 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 主管③ 翌日点滴開始まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リサードD輸液 500mL(ヴィーンD) … 1袋 ? mL/h … 167 主管① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 2袋 生理食塩液バッグ 500mL … 2袋 マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? mL/h … 167 主管② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 主管①投与終了後、側管より投与 ? 分間かけて … 15 管注 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 90 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 20mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 5 【全量250mLに調製】 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 主管③ 翌朝まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リサードD輸液 500mL(ヴィーンD) … 1袋 ? mL/h … 167 主管① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 2袋 生理食塩液バッグ 500mL … 2袋 マンニトールS注射液 300mL … 1瓶 ? mL/h … 167 主管② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>クラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 主管①投与終了後、側管より投与 ? 分間かけて … 15 管注 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)エトボシド注 … 100mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 90 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 20mg/m<sup>2</sup> ? 時間かけて … 5 【全量250mLに調製】 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 主管③ 翌朝まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>
薬物投与	アプレタントCap(125) … 1Cap 1 × / 1日	アプレタントCap(80) … 1Cap 1 × 朝食後 / 4日			

5	6
8日後	休業期間
15日後	20日後
<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ルート確保用 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)プレオ注射用 … 30mg/body ? 分間かけて … 30 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開でフラッシュ 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 ルート確保用 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)プレオ注射用 … 30mg/body ? 分間かけて … 30 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 全開でフラッシュ 点滴注射 … 1 1回</p> <p>■---【コメント】 休業期間</p>