

# GC療法(尿路上皮癌)

	1	2	3	4
	基準日	7日後	14日後	休業期間
点滴・注射	<p>■---【注射】 ソルラクト輸液 500mL[ラテック] … 1袋 ? mL/h … 167 点滴注射 … 1 1回 ビファージェン配合静注20mL [強ミ] … 1管 ゲムシタピン投与前に側管より投与 静脈内注射 … 1 1回 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ゲムシタピン投与前に側管より投与 静脈内注射 … 1 1回 大塚糖液 5% (100mL)(ブドウ糖注) … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 30 デキサート終了後側管より投与 点滴注射 … 1 1回 YDソリター-T3号輸液[500mL][ヒシナルク] … 1袋 ? mL/h … 167 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 ソルラクト輸液 500mL[ラテック] … 1袋 ? mL/h … 200 ① 点滴注射 … 1 1回 YDソリター-T3号輸液[500mL][ヒシナルク] … 1袋 ? mL/h … 200 ② 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋 生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 マンニトールS注射液 300mL … 300mL アスパラギン酸カリウム注10mEq[アスパラK] … 2キット ? mL/h … 200 ③ 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキン静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 2瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ③の開始30分後に側管より投与 ③-a ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 70mg/m<sup>2</sup> ? mL/h … 50 ③の開始1時間後より ③-b 点滴注射 … 1 1回 YDソリター-T3号輸液[500mL][ヒシナルク] … 1袋 ④ 翌朝まで持続 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】 生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 ビファージェン配合静注20mL [強ミ] … 1管 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液 5% (100mL)(ブドウ糖注) … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m<sup>2</sup> ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (50mL) … 1瓶 × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】 休業期間</p>
薬物投与		<p>アプレピタントCap(125) … 1Cap 1×/1日 アプレピタントCap(80) … 1Cap 1×/2日(翌日より) デキサメタゾン(0.5) … 16錠 2×/3日(翌日より)</p>		