

M-VEC療法(尿路上皮癌)

	1	2	3	4	5(休業期間)	
	基準日	1日後	2日後	14日後	21日後	
		1日後	2日後	14日後	27日後	
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>リナセトD輸液 500mL(ヴァインD) … 1袋 マロン静注 7% (20mL) … 20mL ? 時間かけて … 4 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 抗) メントレキセート注射液 … 30mg/m² ? 分間かけて … 30 側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? mL/h … 200 本体① 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液【20mL】 … 1管 抗) エクザール注射用 … 3mg/m² ゆっくり静注 × 1回 医師の指示通り 調製時は生理食塩水10mLで1Vを溶解し必要分抜き取る 本体①開始時ルート 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>注射用水【20mL】 … 1管 抗) エピルピシン注 … 30mg/m² ゆっくり静注 × 1回 医師の指示通り 本体①開始時ルート 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ソル・ド・ロール静注用125mg (溶解液付) … 1瓶 ? mL/h … 200 × 1回 医師の指示通り 本体② 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 フロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 × 1回 医師の指示通り ? 分間かけて … 15 本体②開始時側管より 管注 … 1 1回</p> <p>大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋 生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 マニトールS注射液 300mL … 100mL アスパラギン酸カルウム注10mEq[アスパラK] … 3キット 抗) シスプラチン注 … 70mg/m² ? mL/h … 200 × 1回 医師の指示通り シスプラチン投与時はバッグを遮光して投与すること 本体③ 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚糖液5% 500mL (ブドウ糖注) … 1袋 生理食塩液バッグ「フソー」1L … 1袋 YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 マニトールS注射液 300mL … 200mL アスパラギン酸カルウム注10mEq[アスパラK] … 4キット ? mL/h … 200 × 1回 医師の指示通り 本体④ 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>ソリタックス-H輸液 (500mL) … 1袋 ? mL/h … 200 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リナセトD輸液 500mL(ヴァインD) … 1袋 マロン静注 7% (20mL) … 20mL ? 時間かけて … 2 × 1回 医師の指示通り ①メインルート 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗) メントレキセート注射液 … 30mg/m² ? 分間かけて … 30 ルート確保後、側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 ②メインルート 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗) エクザール注射用 … 3mg/m² ? 分間かけて … 30 側管より 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>リナセトD輸液 500mL(ヴァインD) … 1袋 マロン静注 7% (20mL) … 20mL ? 時間かけて … 2 × 1回 医師の指示通り ①メインルート 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗) メントレキセート注射液 … 30mg/m² ? 分間かけて … 30 ルート確保後、側管より投与 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚生食注 (50mL) … 1瓶 側管より 点滴注射 … 1 1回</p> <p>YDリタ-T3号輸液【500mL】[ヒナルク] … 1袋 ? 時間かけて … 2 ②メインルート 点滴注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 抗) エクザール注射用 … 3mg/m² ? 分間かけて … 30 側管より 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>
薬物投与		<p>アフレビタントカプセル125mg … 1cap 1 × / 1日 化療開始1時間～1時間30分前</p>	<p>アフレビタントカプセル80mg … 1cap 1 × 朝食後 / 2日</p>			