

GEM+CDDP療法(胆道癌)

	1	2	3
	基準日	7日後	20日後
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚糖液 5% 《100mL》(ブドウ糖注) … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m² ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 分間かけて … 60 点滴注射 … 1 1回</p> <p>マンニトールS注射液 300mL … 200mL ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>プロセド注20mg[ラックス注] … 1管 × 1回 医師の指示通り シスプラチン投与前に 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)シスプラチン注 … 25mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 分間かけて … 60 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 アロキシ静注 0.75mg (5mL) … 1瓶 テキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>大塚糖液 5% 《100mL》(ブドウ糖注) … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m² ? 分間かけて … 30 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 分間かけて … 60 点滴注射 … 1 1回</p> <p>マンニトールS注射液 300mL … 200mL ? 分間かけて … 15 点滴注射 … 1 1回</p> <p>プロセド注20mg[ラックス注] … 1管 × 1回 医師の指示通り シスプラチン投与前に 静脈内注射 … 1 1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 1袋 抗)シスプラチン注 … 25mg/m² ? 分間かけて … 90 点滴注射 … 1 1回</p> <p>ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 ? 分間かけて … 60 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>