パドセブ単独療法（尿路上皮癌）

	1	2	3	休薬期間
	基準日	7日後	14日後	27日後
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」100mL … 1瓶 側管開始後クランプ メインルート 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 フィルター付き点滴セットを使用すること 側管より投与① 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 抗）パドセブ点滴静注 … 1.25mg/kg 注射用水【20mL】… 1管 1Vあたり注射用水3.3mLで溶解（10mg/mL） 30 分間かけて 側管より投与② 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 全開で 側管より投与③ 点滴注射 … 1	■---【注射】 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」100mL … 1瓶 側管開始後クランプ メインルート 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 フィルター付き点滴セットを使用すること 側管より投与① 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 抗）パドセブ点滴静注 … 1.25mg/kg 注射用水【20mL】… 1管 1Vあたり注射用水3.3mLで溶解（10mg/mL） 30 分間かけて 側管より投与② 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 全開で 側管より投与③ 点滴注射 … 1	■---【注射】 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」100mL … 1瓶 側管開始後クランプ メインルート 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 フィルター付き点滴セットを使用すること 側管より投与① 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 抗）パドセブ点滴静注 … 1.25mg/kg 注射用水【20mL】… 1管 1Vあたり注射用水3.3mLで溶解（10mg/mL） 30 分間かけて 側管より投与② 点滴注射 … 1 大塚生食注（50mL）… 1瓶 全開で 側管より投与③ 点滴注射 … 1	■---【コメント】 休薬期間