

乳がんNAC・免疫療法① CT+Pembro(トリプルネガティブ乳がん)

	Day1	Day8	Day15	Day21
点滴・注射	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管① ★フィルター付の点滴セットを使用すること 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)キイトルーダ点滴静注 … 200mg/body 側管② 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管③ 全開で 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ハロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 … 1瓶 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管④ 30 分間かけて 側管④開始時にレスタミン錠を内服させること 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)バクリタキセル注 … 80mg/m² 側管⑤ 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)カルボプラチン点滴静注液 … AUC=5 側管⑥ 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管⑦ 全開で 1回	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて 側管①開始時にレスタミン錠を内服させること ★フィルター付の点滴セットを使用すること 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)バクリタキセル注 … 80mg/m² 側管② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管③ 全開で 1回	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL … 1管 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて 側管①開始時にレスタミン錠を内服させること ★フィルター付の点滴セットを使用すること 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)バクリタキセル注 … 80mg/m² 側管② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管③ 全開で 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	レスタミン錠(10) … 5錠 1x/1日 アブレビタントcap(125) … 1cap 1x/1日 アブレビタントcap(80) … 1cap 1x/1日 (Day2-3)	レスタミン錠(10) … 5錠 1x/1日	レスタミン錠(10) … 5錠 1x/1日	