

乳がんNAC・免疫療法② EC+Pembro(トリプルネガティブ乳がん)

	Day1	Day21
	<p>■---【注射】</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶</p> <p>★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ</p> <p>1回</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>◎側管①フィルター付輸液セットより点滴</p> <p>閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管)を接続する</p> <p>1回</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶</p> <p>抗)キイトルーダ点滴静注 … 200mg/body</p> <p>30分間かけて</p> <p>◎側管②フィルター付輸液セットより点滴</p> <p>1回</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>◎側管③フィルター付輸液セットより点滴</p> <p>全開で</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>ハロノセト静注0.75mg/5mL「タイホウ」… 1瓶</p> <p>デキサート注射液 6.6mg/2mL(旧8mg) … 1瓶</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL(旧4mg) … 1管</p> <p>側管③終了後に開始</p> <p>★主管②閉鎖式輸液セットより投与</p> <p>30分間かけて</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>抗)エビルピシン注 … 90mg/m²</p> <p>★主管③閉鎖式輸液セットより投与</p> <p>5分間かけて</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>自然滴下にて投与すること (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可)</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注(250mL) … 1袋</p> <p>抗)エンドキサン … 600mg/m²</p> <p>★主管④閉鎖式輸液セットより投与</p> <p>1時間かけて</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>全開で</p> <p>★主管⑤閉鎖式輸液セットより投与</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
点滴・注射		
薬物投与	<p>アプレピタントcap(125) … 1cap 1x/1日</p> <p>アプレピタントcap(80) … 1cap 1x/1日 (Day2-3)</p>	