

ゾルベツキシマブ+CAPOX療法 (HER2陰性CLDN18. 2陽性胃癌)

	Day1	Day21
	■---【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 側管開始後クランプ メインルート 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 アロカリス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ハロノセロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」… 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ホラミン注 5mg (1mL) … 1管 30 分間かけて 投与速度は通常の2倍速度に設定すること(界面活性剤を含有しているため通常の投与速度では予定時刻に投与が終了しません) カベンチン併用:1日2000mg/㎡ 分2 14日間服薬 側管より投与① 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 側管より投与② 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 1袋 抗)ピロイ点滴静注用 … 600mg/㎡ (初回のみ800mg/㎡) 注射用水【20mL】… 3管 ★投与速度は「ピロイ投与速度計算ツール」より算出すること 1/バイアルあたり注射用水5mLで溶解20mg/mLの溶液を調製し、必要量使用すること。また、生食希釈後の濃度は2mg/mLとなるように希釈液量を調整すること。 側管より投与③ 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 200 mL/h 側管より投与④ 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液〈5%〉500mL(ブドウ糖注 … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 130mg/㎡ 2 時間かけて 側管より投与⑤ 点滴注射 … 1 1回 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 0.5管 オキサリプラチンに混注 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 側管より投与⑥ 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
点滴・注射		
薬物投与	カベシタピン錠(300) 1日2回 2週投与、1週休薬 体表面積 / 初回基準1回量 1. 36㎡未満 / 1200mg (4錠) 1. 36㎡以上～1. 66㎡未満 / 1500mg (5錠) 1. 66㎡以上～1. 96㎡未満 / 1800mg (6錠) 1. 96㎡以上 / 2100mg (7錠)	