

		1 休業期間
	基準日	13日後
点滴・注射	■---【注射】 生食注シリンジ「オーツカ」10mL … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ポートトラブル確認用 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 アロカス点滴静注235mg 10mL … 1瓶 ハロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 ホラミン注 5mg (1mL) … 1管 30 分間かけて 投与速度は通常の2倍速度に設定すること(界面活性剤を含有しているため通常の投与速度では予定時刻に投与が終了しません) 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 … 1袋 抗)ピロイ点滴静注用 … 400mg/m²(初回のみ800mg/m²) 注射用水【20mL】 … 2管 ★投与速度は「ピロイ投与速度計算ツール」より算出すること 1バイアルあたり注射用水5mLで溶解20mg/mLの溶液を調製し、必要量使用すること。また、生食希釈後の濃度は2mg/mLとなるように希釈液量を調整すること。 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 200 mL/h 点滴注射 … 1 1回 ブドウ糖注射液〈5%〉250mL「テルモ」 … 1袋 抗)レボホリナート点滴静注用 … 200mg/m² 2 時間かけて オキサリプラチン注の側管より 点滴注射 … 1 1回 ブドウ糖注射液〈5%〉250mL「テルモ」 … 1袋 抗)オキサリプラチン点滴静注液 … 85mg/m² 2 時間かけて レボホリナートと同時に 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)フルオロウラシル注 … 400mg/m² レボホリナート、オキサリプラチン終了後全開で投与 × 1回 医師の指示通り 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)フルオロウラシル注 … 2400mg/m² 46 時間かけて 流量換算表を参照し、適当量の生食を充填する 点滴注射 … 1 1回 ヘパリンNaロック用100単位/mL【10mL】 … 1筒 CVポートに静注 × 1回 医師の指示通り 抗悪性腫瘍剤局所持続注入 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与		
検査		
検査		