

A+AVD療法(未治療のCD30陽性ホジキンリンパ腫)

	Day1	Day15	Day28
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ハロセトン静注0.75mg/5mL「タイホウ」… 1瓶 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサト注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与① 30分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL 抗)エクザール注射用 … 6mg/m² 側管より投与② 5分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 100mL 抗)ドキシソルピシン注射 … 25mg/m² 側管より投与③ 5分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 500mL 抗)ダカルバジン注用 … 375mg/m² 側管より投与④ 3時間かけて 点滴ルートも遮光する 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL × 1回 医師の指示通り 側管より投与⑤ 全開で 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アドセトリス点滴静注用 … 1.2mg/kg 注射用水【20mL】… 2管 側管より投与⑥ 1時間かけて 1Vあたり10.5mLの注射用水で溶解し5mg/mLの濃度とする 44mg/body以下の場合には生食から50mL抜き、残りの50mLに必要量を希釈すること 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL × 1回 医師の指示通り 側管より投与⑦ 全開で 点滴注射 … 1</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ハロセトン静注0.75mg/5mL「タイホウ」… 1瓶 デキサト注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 デキサト注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 側管より投与① 30分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL 抗)エクザール注射用 … 6mg/m² 側管より投与② 5分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 100mL 抗)ドキシソルピシン注射 … 25mg/m² 側管より投与③ 5分間かけて 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 500mL 抗)ダカルバジン注用 … 375mg/m² 側管より投与④ 3時間かけて 点滴ルートも遮光する 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL × 1回 医師の指示通り 側管より投与⑤ 全開で 点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)アドセトリス点滴静注用 … 1.2mg/kg 注射用水【20mL】… 2管 側管より投与⑥ 1時間かけて 1Vあたり10.5mLの注射用水で溶解し5mg/mLの濃度とする 44mg/body以下の場合には生食から50mL抜き、残りの50mLに必要量を希釈すること 点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバック) … 50mL × 1回 医師の指示通り 側管より投与⑦ 全開で 点滴注射 … 1</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>
薬物投与	<p>アブレビタントCap(125)…1Cap 1×/1日 アブレビタントCap(80)…1Cap 1×朝食後/2日 (Day2-3)</p>	<p>アブレビタントCap(125)…1Cap 1×/1日 アブレビタントCap(80)…1Cap 1×朝食後/2日 (Day16-17)</p>	