

GB療法（初回、CD20陽性濾胞性リンパ腫）

	Day1	Day2	Day3	Day8	Day15	Day28
	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管開始後クランプ メインルート ☆メインルートにブラネタを追加して2連で使用 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 フル・ド・ロー静注用40mg（溶解液付） …… 2瓶 側管より投与① ★フルド付き点滴セットを使用すること 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管より投与② 点滴開始時にアトミソロン錠及びオロパタジン錠を内服 1 時間かけて 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注（250mL） …… 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 …… 1000mg 側管より投与③ 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 側管より投与④ 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管開始後クランプ メインルート ☆メインルートにブラネタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 フル・ド・ロー静注用40mg（溶解液付） …… 2瓶 側管より投与① ★フルド付き点滴セットを使用すること 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管より投与② 点滴開始時にアトミソロン錠及びオロパタジン錠を内服 1 時間かけて 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注（250mL） …… 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 …… 1000mg 側管より投与③ 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 側管より投与④ 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管開始後クランプ メインルート ☆メインルートにブラネタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 フル・ド・ロー静注用40mg（溶解液付） …… 2瓶 側管より投与① ★フルド付き点滴セットを使用すること 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管より投与② 点滴開始時にアトミソロン錠及びオロパタジン錠を内服 1 時間かけて 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注（250mL） …… 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 …… 1000mg 側管より投与③ 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 側管より投与④ 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管開始後クランプ メインルート ☆メインルートにブラネタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 フル・ド・ロー静注用40mg（溶解液付） …… 2瓶 側管より投与① ★フルド付き点滴セットを使用すること 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管より投与② 点滴開始時にアトミソロン錠及びオロパタジン錠を内服 1 時間かけて 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注（250mL） …… 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 …… 1000mg 側管より投与③ 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 側管より投与④ 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管開始後クランプ メインルート ☆メインルートにブラネタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 フル・ド・ロー静注用40mg（溶解液付） …… 2瓶 側管より投与① ★フルド付き点滴セットを使用すること 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液 PL「フー」100mL …… 1瓶 側管より投与② 点滴開始時にアトミソロン錠及びオロパタジン錠を内服 1 時間かけて 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注（250mL） …… 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 …… 1000mg 側管より投与③ 全量250mLとなるよう調製する。 12mL/時から投与を開始し、30分毎に12mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） …… 1袋 側管より投与④ 30 分間かけて 点滴注射 …… 1 1回	■――【コメント】 休業期間
点滴・注射						
薬物投与	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	アプレピタントCap(125) …… 1Cap 1×/1日	アプレピタントCap(80) …… 1Cap 1×朝食後/2日 (Day3-4)	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	

GB療法(2回目以降、CD20陽性濾胞性リンパ腫)

	Day1	Day2	Day3	Day28
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにフラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ★フィルター付き点滴セットを使用すること 側管より投与① 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 210mL 抗)ガザイバ点滴静注 … 1000mg 側管より投与② 全量250mLとなるよう調製する。 25mL/時から投与を開始し、30分毎に25mL/時ずつ、最大100mL/時まで上げることができる。 投与開始30分前までにアセトアミノフェン錠(カロナール)及びオロパチジン錠を服用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与③ 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレピタントを点滴30分前に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレピタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与	カロナール錠(500) … 1×/1日 オロパチジン錠(5) … 1×/1日	アプレピタントCap(125) … 1Cap 1×/1日	アプレピタントCap(80) … 1Cap 1× 朝食後/2日 (Day3-4)	

GB療法（時間短縮、2回目以降、CD20陽性濾胞性リンパ腫）

	Day1	Day2	Day3	Day28
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにフラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 ★フィルター付き点滴セットを使用すること 側管より投与① 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL） … 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 … 1000mg 側管より投与② 全量250mLとなるよう調製する。 25mL/時から投与を開始し、問題がなければ30分後に225mL/時に速度を上げて投与する。 投与開始30分前までにアセトアミノフェン錠（カロナール）及びオロパタジン錠を服用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 側管より投与③ 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを点滴30分前に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与	カロナール錠（500） … 1 × /1日 オロパタジン錠（5） … 1 × /1日	アプレビタントCap（125） … 1Cap 1 × /1日	アプレビタントCap（80） … 1Cap 1 × 朝食後 /2日（Day3-4）	

GB療法（時間短縮、2日間、2回目以降、CD20陽性濾胞性リンパ腫）

	Day1	Day2	Day28
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ ☆メイシルトにプラネクサを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 ◎側管① 30 分間かけて ☆フィルター付き点滴セットを使用すること 点滴開始時にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠、アプレピタントカプセルを服用 閉鎖式輸液セット（主管）の三方活栓部（側管）に接続する 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL） … 210mL 抗）ガザイバ点滴静注 … 1000mg ◎側管② 全量250mLとなるよう調製する。 25mL/時から投与を開始し、問題がなければ30分後に225mL/時に速度を上げて投与する。 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 ◎側管③ 全開で 点滴注射 … 1 1回 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 15 分間かけて 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 自然滴下にて投与すること （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレピタントを点滴30分前に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	カロナール錠（500） … 1 × /1日 オロパタジン錠（5） … 1 × /1日 アプレピタントCap（125） … 1Cap 1 × /1日	アプレピタントCap（80） … 1Cap 1 × 朝食後 /2日（Day3-4）	