

Pola+BR療法 1クール目（再発又は難治性のDLBCL）

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day21
点滴・注射	■――【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL …… 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにグラネキサを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管① 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 …… 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 …… 375mg/m² ×1回 医師の指示通り 側管② 生食は1mg/mLとなるように調製する。 投与は最初の30分間は50mL/時にて点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げて最大400mL/時にて点滴静注する。 過去に投与歴がありInfusion reactionが軽微の場合100mL/時にて点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる。最大400mL/時まで リツキシマブ 点滴開始30分前にアゼチアミジン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管③ 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL …… 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管① ★フィルター付き点滴セットを使用すること 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ボライビー点滴静注 …… 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 …… 1管 側管② 90 分間かけて 1Vあたり30mgは1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする Infusion reactionが起きた場合は休薬し症状が回復したら1/2の速度で再開する。再開後Infusion reactionなければ30分後に元の速度で点滴 ボライビー点滴開始30分～1時間前にアゼチアミジン錠、オロパタジン錠内服 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管③ 全開で 1回	■――【注射】 グラネキサ点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサト注射液 3.3mg/1mL (1B4mg) …… 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを点滴30分前に服薬 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて 点滴注射 …… 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 グラネキサ点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサト注射液 3.3mg/1mL (1B4mg) …… 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて 点滴注射 …… 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【コメント】 休薬期間
薬物投与	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	アプレビタントCap(125) …… 1Cap 1×/1日	アプレビタントCap(80) …… 1Cap 1× 朝食後/2日 (Day3-4)	

	Day1	Day2	Day3	Day21
点滴・注射	■――【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL …… 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにブラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管① 点滴注射 …… 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 …… 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 …… 375mg/m² × 1回 医師の指示通り 側管② 生食は1mg/mLとなるように調製する。 投与は最初の30分間は100mL/時にて点滴、30分毎に100mL/時 ずつ上げる。最大400mL/時まで リツキシマブ 点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管③ 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ アプレビタントを点滴30分前に服用 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ◎側管①フィルター付輸液セットより点滴 閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管) を接続する 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ボライビー点滴静注用 …… 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 …… 1管 30 分間かけて ◎側管②フィルター付輸液セットより点滴 前回Infusion reactionが起きた場合は90分間かけて投与する 1Vあたり30mgは1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し 20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする ボライビー点滴開始30分～1時間前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内 服 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ◎側管③フィルター付輸液セットより点滴 全開で 1回 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) …… 1管 30 分間かけて 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 自然滴下にて投与すること (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液 ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) …… 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて 点滴注射 …… 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液 ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【コメント】 休業期間
薬物投与	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日 アプレビタントCap(125) …… 1Cap 1×/1日	アプレビタントCap(80) …… 1Cap 1× 朝食後/2日 (Day3-4)	

Pola+BR療法 2クール目以降(時間短縮、再発又は難治性のDLBCL)

	Day1	Day2	Day3	Day21
	■――【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL …… 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにブラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管① 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 (250mL) …… 1袋 抗)リツキシマブBS点滴静注 …… 375mg/m² × 1回 医師の指示通り 側管② 【全量が250mLとなるよう調製する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する リツキシマブ点滴開始30分前にアゼタミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 …… 1 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 側管③ 15 分間かけて 1回	■――【注射】 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ アプレビタントを点滴30分前に服用 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ◎側管①フィルター付輸液セットより点滴 閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管)を接続する 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ボライビー点滴静注 …… 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 …… 1管 30 分間かけて ◎側管②フィルター付輸液セットより点滴 前回infusion reactionが起きた場合は90分間かけて投与する 1Vあたり30mgは1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し 20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする ボライビー点滴開始30分～1時間前にアゼタミノフェン錠、オロパタジン錠内服 1回 点滴注射 …… 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 ◎側管③フィルター付輸液セットより点滴 全開で 1回 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) …… 1管 30 分間かけて 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 自然滴下にて投与すること (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 …… 1 1回	■――【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 …… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) …… 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 …… 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 …… 90mg/m² 10 分間かけて 点滴注射 …… 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) …… 1袋 全開で 点滴注射 …… 1 1回	■――【コメント】 休業期間
点滴・注射				
薬物投与	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日	カロナール錠(500) …… 1×/1日 オロパタジン錠(5) …… 1×/1日 アプレビタントCap(125) …… 1Cap 1×/1日	アプレビタントCap(80) …… 1Cap 1×朝食後/2日 (Day3-4)	

Pola+BR療法 2クール目以降(時間短縮、2日間、再発又は難治性のDLBCL)

	Day1	Day2	Day21
	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソ」100mL … 1瓶 ★主管① 閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管① フィルター付輸液セットより点滴 閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管)を接続する 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)リツキシマフBS点滴静注 … 375mg/㎡ ◎側管② フィルター付輸液セットより点滴 【全量が250mLとなるよう調整する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する リツキシマフ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロハタジン錠、アプレビタントcap内服 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管③ フィルター付輸液セットより点滴 15 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ボライビー点滴静注用 … 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 … 1管 ◎側管④ フィルター付輸液セットより点滴 前回Infusion reactionが起きた場合は90分間かけて投与する 1Vあたり30mgは1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し 20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管⑤ フィルター付輸液セットより点滴 全開で 1回 点滴注射 … 1 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (1B4mg) … 1管 ★主管② 閉鎖式輸液セットより投与 側管⑤終了後に開始 15 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg/㎡ ★主管③ 閉鎖式輸液セットより投与 自然滴下で投与(末梢のみ、CVポート使用時は輸液ポンプ使用可) 10 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ★主管④ 閉鎖式輸液セットより投与 全開で 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (1B4mg) … 1管 15 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg/㎡ 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
点滴・注射			
薬物投与	カロナール錠(500) … 1×/1日 オロハタジン錠(5) … 1×/1日 アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日	アプレビタントCap(80) … 1Cap 1× 朝食後/2日(Day2-3)	