

Pola+R-CHP療法 1クール目(未治療DLBCL)

	Day1	Day2	Day3	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにブラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与① 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 … 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m² ×1回 医師の指示通り 側管より投与② 生食は1mg/mLとなるように調製する。 投与は最初の30分間は50mL/時にて点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げて最大400mL/時にて点滴静注する。 過去に投与歴がありInfusion reactionが軽微の場合100mL/時にて点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる。最大400mL/時までリツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与③ 全開で 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与① ☆フィルター付の輸液セットを使用すること 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ボラビー点滴静注 … 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 … 1管 側管より投与② 90分間かけて 1Vあたり30mgは1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする Infusion reactionが起きた場合は休薬し症状が回復したら1/2の速度で再開する。再開後Infusion reactionなければ30分後に元の速度で点滴 ボラビー点滴開始30分～1時間前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与③ 全開で 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラネセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 ★閉鎖式輸液セットを使用すること 15分間かけて 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)ドキシソルピシン注射 … 50mg/m² 5分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 … 1袋 抗)エンドキサン … 750mg/m² 2時間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ×1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>カロナーン錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>カロナーン錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>ブレドニゾロン錠 … 5日間内服 (Day3-7) アプレピタントCap(125) … 1Cap 1×/1日 アプレピタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日 (Day4-5)</p>	

Pola+R-GHP療法 2～6クール目(未治療DLBCL)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにフラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与① 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m² × 1回 医師の指示通り 側管より投与② 生食は1mg/mLとなるように調製する。 投与は最初の30分間は50mL/時にて点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げて最大400mL/時にて点滴静注する。 前回投与の際のInfusion reactionが軽微の場合100mL/時にて点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる(最大400mL/時まで) リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与③ 全開で 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ アプレビタントを点滴30分前に服用 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管①フィルター付輸液セットより点滴 閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管)を接続する 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ボライビー点滴静注 … 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 … 1管 30分間かけて ◎側管②フィルター付輸液セットより点滴 前回Infusion reactionが起きた場合は90分間かけて投与する 1Vあたり30mg(1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする ボライビー点滴開始30分～1時間前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管③フィルター付輸液セットより点滴 全開で 1回 グラニセトン点滴バッグ3mg/100mL「HK」… 1袋 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 15分間かけて 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)ドキシソルピシン注射 … 50mg/m² ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 5分間かけて 点滴注射 … 1 自然滴下にて投与すること (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 1袋 抗)エンドキサン … 750mg/m² ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 2時間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で ★主管⑤閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>
薬物投与	<p>カロナーール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>カロナーール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日 ブレドニゾロン錠 … 5日間内服 (Day2-6) アプレビタントCap(125)…1Cap 1×/1日 アプレビタントCap(80)…1Cap 1×朝食後/2日 (Day3-4)</p>	

Pola+R-GHP療法 2～6クール目(時間短縮、未治療DLBCL)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにフラネクタを追加して2連で使用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ルート確保用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m² × 1回 医師の指示通り 【全量が250mLとなるよう調製する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する リツキシマブ 点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ アプレビタントを点滴30分前に服用 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管①フィルター付輸液セットより点滴 閉鎖式輸液セット(主管)の三方活栓部にフィルター付輸液セット(側管)を接続する 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ボラビヒュー点滴静注 … 1.8mg/kg 注射用水【20mL】 … 1管 30 分間かけて ◎側管②フィルター付輸液セットより点滴 前回Infusion reactionが起きた場合は90分間かけて投与する 1Vあたり30mg(は1.8mL、140mgは7.2mLの注射用水で溶解し 20mg/mLの濃度とする 体重85kg以上の場合は希釈液を100mLにする ボラビヒュー点滴開始30分～1時間前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ◎側管③フィルター付輸液セットより点滴 全開で 1回 グラニセトロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 抗)ドキシソルピシン注射 … 50mg/m² ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 5 分間かけて 点滴注射 … 1 自然滴下にて投与すること (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」 … 1袋 抗)エンドキサン … 750mg/m² ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 2 時間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で ★主管⑤閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休業期間</p>
薬物投与	<p>カロナーール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>カロナーール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日 ブレドニゾロン錠 … 5日間内服 (Day2-6) アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日 アプレビタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日 (Day3-4)</p>	