

R-CHOP療法(悪性リンパ腫)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶 ルート確保用 治療薬投与時に切り替える 残は治療終了後フラッシュに使用 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ500mL … 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m² × 1回 医師の指示通り 生食は1mg/mLとなるように調製する 最初の30分は50mL/時で点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げ、最大400mL/時で点滴静注する。 2回目以降は副作用が軽微の場合100mL/時で点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる。最大400mL/時まで。 リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 ? 分間かけて … 15 ★閉鎖式輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)オンコビン注射用 … 1.4mg/m² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL … 100mL 抗)ドキソルビシン注射 … 50mg/m² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL … 500mL 抗)エンドキサン … 750mg/m² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	カロナール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日	プレドニゾロン錠 … 5日間内服(Day2-6) アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日 アプレビタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日(Day3-4)	

R-CHOP療法(時間短縮、悪性リンパ腫)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにプラネタを追加して2連で使用 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与① 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注(250mL) … 1袋 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg × 1回 医師の指示通り 側管より投与② 【全量が250mLとなるよう調製する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管より投与③ 15 分間かけて 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋 ? 分間かけて … 15 ★閉鎖式輸液セットを使用すること 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)オンコビン注射用 … 1.4mg/m ² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液PL「フソー」100mL … 100mL 抗)ドキソルビシン注射 … 50mg/m ² ? 分間かけて … 5 点滴注射 … 1 1回 生理食塩液バッグ 500mL … 500mL 抗)エンドキサン … 750mg/m ² ? 時間かけて … 2 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 × 1回 医師の指示通り 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	カロナール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日	プレドニゾロン錠 … 5日間内服(Day2-6) アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日 アプレビタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日(Day3-4)	