

R-THP-COP療法(悪性リンパ腫)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液PL「フソー」100mL … 1瓶</p> <p>ルート確保用</p> <p>治療薬投与時に切り替える</p> <p>残は治療終了後フラッシュに使用</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液バッグ500mL … 500mL</p> <p>抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m²</p> <p>× 1回 医師の指示通り</p> <p>生食は1mg/mLとなるように調製する</p> <p>最初の30分は50mL/時で点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げ、最大400mL/時で点滴静注する。</p> <p>2回目以降は副作用が軽微の場合100mL/時で点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる。最大400mL/時まで。</p> <p>リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋</p> <p>? 分間かけて … 15</p> <p>★閉鎖式輸液セットを使用すること</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>抗)オンコビン注射用 … 1.4mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 5</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>★自然滴下にて投与すること★</p> <p>(末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可)</p> <p>1回</p> <p>大塚糖液〈5%〉100mL(ブドウ糖注 … 1瓶</p> <p>抗)テラルビシン注射用 … 40mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 5</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>★自然滴下にて投与すること★</p> <p>(末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可)</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 500mL</p> <p>抗)エンドキサン … 650mg/m²</p> <p>? 時間かけて … 2</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>× 1回 医師の指示通り</p> <p>全開で</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>カロナール錠(500) … 1×/1日</p> <p>オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>プレドニゾロン錠 … 5日間内服(Day2-6)</p> <p>アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日</p> <p>アプレビタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日(Day3-4)</p>	

R-THP-COP療法(時間短縮、悪性リンパ腫)

	Day1	Day2	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶</p> <p>メインルート</p> <p>側管開始後クランプ</p> <p>☆メインルートにフラネクサを追加して2連で使用</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>側管より投与①</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 (250mL) … 1袋</p> <p>抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg/m²</p> <p>× 1回 医師の指示通り</p> <p>側管より投与②</p> <p>【全量が250mLとなるよう調製する】</p> <p>100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する</p> <p>リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>側管より投与③</p> <p>15 分間かけて</p> <p>1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL … 1袋</p> <p>? 分間かけて … 15</p> <p>★閉鎖式輸液セットを使用すること</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>抗)オンコビン注射用 … 1.4mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 5</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>★自然滴下にて投与すること★</p> <p>(末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可)</p> <p>1回</p> <p>大塚糖液〈5%〉100mL(フドウ糖注 … 1瓶</p> <p>抗)テラルビシン注射用 … 40mg/m²</p> <p>? 分間かけて … 5</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>★自然滴下にて投与すること★</p> <p>(末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可)</p> <p>1回</p> <p>生理食塩液バッグ 500mL … 500mL</p> <p>抗)エンドキサン … 650mg/m²</p> <p>? 時間かけて … 2</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p> <p>大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋</p> <p>× 1回 医師の指示通り</p> <p>全開で</p> <p>点滴注射 … 1</p> <p>1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>
薬物投与	<p>カロナール錠(500) … 1×/1日</p> <p>オロパタジン錠(5) … 1×/1日</p>	<p>プレドニゾロン錠 … 5日間内服(Day2-6)</p> <p>アプレビタントCap(125) … 1Cap 1×/1日</p> <p>アプレビタントCap(80) … 1Cap 1×朝食後/2日(Day3-4)</p>	