

R－B療法（低悪性度B-ML）

	Day1	Day2	Day3	Day28
点滴・注射	■---【注射】 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 側管開始後クランプ メインルート 点滴注射 … 1 ☆メインルートにフラネタを追加して2連で使用 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管① 1回 生理食塩液バッグ 500mL「大塚」… 500mL 抗)リツキシマブBS点滴静注 … 375mg × 1回 医師の指示通り 側管② 生食は1mg/mLとなるように調製する。 投与は最初の30分間は50mL/時にて点滴、注入速度を30分毎に50mL/時ずつ上げて、最大400mL/時にて点滴静注する。 2回目以降は副作用が軽微の場合100mL/時にて点滴、30分毎に100mL/時ずつ上げる。最大400mL/時まで リツキシマブ点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管③ 400 mL/h 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを点滴30分前に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」… 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL (旧4mg) … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 抗)ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ (末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可) 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与	カロナール錠(500) … 1×/1日 オロパタジン錠(5) … 1×/1日	アプレビタントCap(125)…1Cap 1×/1日	アプレビタントCap(80)…1Cap 1×朝食後/2日 (Day3-4)	

R－B療法（時間短縮、低悪性度B-ML）

	Day1	Day2	Day3	Day28
点滴・注射	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ ☆メインルートにフナネタを追加して2連で使用 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 側管より投与① ルート確保用 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL） … 1袋 抗）リツキシマブBS点滴静注 … 375mg × 1回 医師の指示通り 側管より投与② 【全量が250mLとなるよう調製する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する リツキシマブ 点滴開始30分前にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠内服 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 15 分間かけて 側管より投与③ 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを側管①開始30分前に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ペンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与	カロナール錠（500） … 1 × /1日 オロパタジン錠（5） … 1 × /1日	アプレビタントCap（125）…1Cap 1 × /1日	アプレビタントCap（80）…1Cap 1 × 朝食後 /2日（Day3-4）	

R－B療法（時間短縮、2日間、低悪性度B-ML）

	Day1	Day2	Day28
点滴・注射	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ★主管①閉鎖式輸液セットのルート確保用 側管開始後クランプ 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 ◎側管① 30 分間かけて 点滴開始時にアセトアミノフェン錠、オロパタジン錠、アプレビタントカプセルを服用 閉鎖式輸液セット（主管）の三方活栓部（側管）に接続する 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注（250mL） … 1袋 抗）リツキシマブBS点滴静注 … 375mg ×1回 医師の指示通り ◎側管② 【全量が250mLとなるよう調製する】 100mL/時から開始し、30分後に200mL/時にて点滴静注する 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 15 分間かけて ◎側管③ 1回 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 15 分間かけて 側管③終了後に開始 ★主管②閉鎖式輸液セットより投与 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★主管③閉鎖式輸液セットより投与 自然滴下にて投与すること （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 ★主管④閉鎖式輸液セットより投与 1回	■---【注射】 グラニセロン点滴バッグ3mg/100mL「HK」 … 1袋 デキサート注射液 3.3mg/1mL（旧4mg） … 1管 30 分間かけて ★閉鎖式輸液セットを使用すること アプレビタントを朝食後に服薬 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 抗）ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 … 90mg 10 分間かけて 点滴注射 … 1 ★自然滴下にて投与すること★ （末梢から投与する場合のみ。中心静脈からの投与の場合は輸液ポンプ使用可） 1回 大塚生食注 50mL（ソフトバッグ） … 1袋 全開で 点滴注射 … 1 1回	■---【コメント】 休薬期間
薬物投与	カロナール錠（500） … 1×/1日 オロパタジン錠（5） … 1×/1日 アプレビタントCap（125）…1Cap 1×/1日	アプレビタントCap（80）…1Cap 1×朝食後/2日（Day2-3）	