

	1	2	休業期間
	基準日	7日後	20日後
点滴・注射	■――【注射】 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL〔ラクテック〕 … 1袋 メインルート① ★ブラネクタを追加して2連で使用 メインルート①投与中に側管①～⑤の投与を終了させること。 2 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ハロ/セロD静注0.75mg/5mL〔タイホ〕 … 1瓶 デキサト注射液 6.6mg/2mL (IB8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて ★フィルター付き点滴セットを使用すること 1回 点滴注射 … 1 大塚糖液〈5%〉100mL(ブドウ糖注 … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/㎡ 側管② 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) … 8mL 側管③ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 マンニトールS注射液 300mL … 200mL 側管④ 15 分間かけて 末梢より投与する場合、マンニトール投与中は本体を止めておくこと（CVポートからの場合は同時投与可） 1回 静脈内注射 … 1 フロセド注20mg〔テックス注〕 … 1管 側管⑤ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 25mg/㎡ メインルート② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL〔ラクテック〕 … 1袋 メインルート③ 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管⑥ メインルート③終了後側管より投与開始 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)イミフィンジ点滴静注 … 1500mg/body 側管⑦ 1 時間かけて 体重30kg以下の場合は20mg/kgで投与 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 側管⑧ 全開で 1回	■――【注射】 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL〔ラクテック〕 … 1袋 メインルート① メインルート①投与中に側管①～⑤の投与を終了させること。 ★ブラネクタを追加して2連で使用 2 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 ハロ/セロD静注0.75mg/5mL〔タイホ〕 … 1瓶 デキサト注射液 6.6mg/2mL (IB8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚糖液〈5%〉100mL(ブドウ糖注 … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/㎡ 側管② 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) … 8mL 側管③ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 マンニトールS注射液 300mL … 200mL 側管④ 15 分間かけて 末梢より投与する場合、マンニトール投与中は本体を止めておくこと（CVポートからの場合は同時投与可） 1回 静脈内注射 … 1 フロセド注20mg〔テックス注〕 … 1管 側管⑤ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 25mg/㎡ メインルート② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL〔ラクテック〕 … 1袋 メインルート③ 1 時間かけて 1回	■――【コメント】 休業期間
薬物投与			
検査			
検査			