

GCS療法(胆道癌)

	Day1	Day14
	■---【注射】 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 Day1タ～Day8朝の7日間S-1内服(体表面積1.25㎡未満:80mg/日、1.25～1.5㎡:100mg/日、1.5㎡以上:120mg/日) メインルート① メインルート①投与中に側管①～⑤の投与を終了させること。 ★プラネクタを追加して2連で使用 2 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 パロ/セトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 … 1瓶 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚糖液 (5%) 100mL(ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/㎡ 側管② 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フソー」100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) … 8mL 側管③ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 マンニトールS注射液 300mL … 200mL 側管④ 15 分間かけて 末梢より投与する場合、マンニトール投与中は本体を止めておくこと(CVポートからの場合は同時投与可) 1回 静脈内注射 … 1 フロセミド注20mg[ラシックス注] … 1管 側管⑤ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)シスプラチン注 … 25mg/㎡ メインルート② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL[ラクテック] … 1袋 メインルート③ 1 時間かけて 1回	■---【コメント】 休薬期間
点滴・注射		
		</