

ペムブロリズマブ＋GC療法（手術不能胆道癌）

	Day1	Day8	Day21
点滴・注射	■---【注射】 点滴注射 … 1 生理食塩液ﾊﾞｯｸﾞ 500mL「大塚」… 1袋 メインルート① ★ブランクタを追加して2連で使用 メインルート①投与中に側管①～⑧の投与を終了させること。 3 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトﾊﾞｯｸﾞ) … 1袋 側管① ★フィルター付の点滴セットを使用すること 1回 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」 100mL … 1瓶 抗)キイトルーﾀ点滴静注 … 200mg/body 30 分間かけて 側管② 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトﾊﾞｯｸﾞ) … 1袋 全開で 側管③ 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」 100mL … 1瓶 ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾝ」… 1瓶 ﾃｷｻｰﾄ注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管④ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚糖液 <5%> 100mL(ﾌﾄﾞｳ糖注 … 1瓶 抗)ﾍﾞﾙﾏﾋﾞﾝ点滴静注用 … 1000mg/㎡ 側管⑤ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) … 8mL 側管⑥ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 マンニトールS注射液 300mL … 200mL 側管⑦ 15 分間かけて 末梢より投与する場合、マンニトール投与中は本体を止めておくこと(CVポートからの場合は同時投与可) 1回 静脈内注射 … 1 ﾌﾛｾﾃﾄ注20mg[ﾗｯｸｽ注] … 1管 側管⑧ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 … 25mg/㎡ メインルート② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL[ﾗｸﾃｯｸ] … 1袋 メインルート③ 1 時間かけて 1回	■---【注射】 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL[ﾗｸﾃｯｸ] … 1袋 メインルート① メインルート①投与中に側管①～⑤の投与を終了させること。 ★ブランクタを追加して2連で使用 2 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」 100mL … 1瓶 ﾊﾞﾛ/ｾﾄﾛﾝ静注0.75mg/5mL「ﾀｲﾎﾝ」… 1瓶 ﾃｷｻｰﾄ注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管① 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 大塚糖液 <5%> 100mL(ﾌﾄﾞｳ糖注 … 1瓶 抗)ﾍﾞﾙﾏﾋﾞﾝ点滴静注用 … 1000mg/㎡ 側管② 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「ﾌｿｰ」 100mL … 1瓶 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) … 8mL 側管③ 30 分間かけて 1回 点滴注射 … 1 マンニトールS注射液 300mL … 200mL 側管④ 15 分間かけて 末梢より投与する場合、マンニトール投与中は本体を止めておくこと(CVポートからの場合は同時投与可) 1回 静脈内注射 … 1 ﾌﾛｾﾃﾄ注20mg[ﾗｯｸｽ注] … 1管 側管⑤ 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 (250mL) … 1袋 抗)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注 … 25mg/㎡ メインルート② 1 時間かけて 1回 点滴注射 … 1 ソルラクト輸液 500mL[ﾗｸﾃｯｸ] … 1袋 メインルート③ 1 時間かけて 1回	■---【コメント】 休業期間
薬物投与			
検査			
検査			