

ペムブロリズマブ＋GEM維持療法(手術不能胆道癌)

	Day1	Day8	Day21
点滴・注射	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 点滴注射 … 1 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 ★フィルター付き点滴セットを使用すること 側管① 1回 点滴注射 … 1 生理食塩液 PL「フー」100mL … 1瓶 抗)キイトルーダ点滴静注 … 200mg/body 30 分間かけて 側管② 1回 点滴注射 … 1 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 全開で 側管③ 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管④ 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液 (5%) 100mL(ブドウ糖注 … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m² 側管⑤ 30 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 × 1回 医師の指示通り 側管⑥ 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【注射】</p> <p>生理食塩液 PL「フー」100mL … 1瓶 メインルート 側管開始後クランプ 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 デキサート注射液 6.6mg/2mL (旧8mg) … 1瓶 側管① 15 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚糖液 (5%) 100mL(ブドウ糖注 … 1瓶 抗)ゲムシタピン点滴静注用 … 1000mg/m² 側管② 30 分間かけて 点滴注射 … 1 1回 大塚生食注 50mL(ソフトバッグ) … 1袋 × 1回 医師の指示通り 側管③ 全開で 点滴注射 … 1 1回</p>	<p>■---【コメント】</p> <p>休薬期間</p>